

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่

สถานการณ์ต่างประเทศ

องค์การอนามัยโลกรายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในภาพรวมทั่วโลก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 โดยภาพรวมในขณะนี้ โรคไข้หวัดใหญ่ในเขตอบอุ่นของซีกโลกใต้ เขตภาคกลางซีกโลกเหนือ มีรายงานว่าเพิ่มขึ้นในบางประเทศในเขตร้อน พบรายงานโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล โดยส่วนใหญ่ทั่วโลกพบไข้หวัดใหญ่ชนิด A รวมถึงปัจจุบันมีหลายประเทศที่กำลังเข้าสู่ช่วงฤดูกาลของไข้หวัดใหญ่ องค์การอนามัยโลกจึงแนะนำให้มีการจัดการที่เหมาะสมเพื่อควบคุมการติดเชื้อ และฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเสี่ยง รายละเอียดสถานการณ์ในแต่ละภูมิภาค ดังต่อไปนี้


- ในเขตอบอุ่นของซีกโลกใต้ สถานการณ์ไข้หวัดใหญ่อยู่ในระดับต่ำ และพบรายงานไข้หวัดใหญ่ในประเทศแอฟริกาใต้
- ในประเทศชิลี และประเทศปารากวัย สถานการณ์ไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้น มีรายงานการพบผู้ป่วยกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ILI) (RSV) และSARI เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่พบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A (H1N1) pdm09 และ A (H3N2) พบรายงานไข้หวัดใหญ่ในประเทศบราซิล
- ในแอฟริกาใต้ สถานการณ์ไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้น มีรายงานการพบผู้ป่วยกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ILI) มีการรายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ชนิด A (H1N1) pdm09 และพบรายงานไข้หวัดใหญ่ประเทศแอฟริกาใต้
- ในประเทศแคริบเบียน มีการรายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ชนิด A (H1N1) pdm09 สถานการณ์ของระบบทางเดินหายใจ (RSV) และ SARI อยู่ในระดับต่ำ และพบรายงานไข้หวัดใหญ่ในประเทศเฮติ
- ในประเทศอเมริกากลาง มีการรายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ชนิด A (H1N1) pdm09 อยู่ในระดับสูง พบรายงานไข้หวัดใหญ่ในประเทศสาธารณรัฐกัวเตมาลา และประเทศสาธารณรัฐฮอนดูรัส
- ในโอเชียเนีย สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่พบเชื้อไวรัส B Yamagata-lineage พบรายงานไข้หวัดใหญ่ในประเทศออสเตรเลีย และประเทศนิวซีแลนด์

- ในอเมริกาใต้ สถานการณ์ไข้หวัดใหญ่ลดลง ส่วนใหญ่พบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A (H1N1) pdm09 และ B เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง พบรายงานไข้หวัดใหญ่ในประเทศโบลิเวีย และการติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลัน และโรคปอดบวมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในกลุ่มอายุต่ำกว่า 5 ปี และพบรายงานไข้หวัดใหญ่ในประเทศเปรู
- ในแอฟริกาตะวันตก ส่วนใหญ่พบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด B พบรายงานสถานการณ์ไข้หวัดใหญ่ในประเทศโกตดิวัวร์ ประเทศกานา และประเทศโตโก ในแอฟริกากลาง มีรายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในระดับต่ำ พบรายงานไข้หวัดใหญ่ในประเทศแคเมอรูน สาธารณรัฐแอฟริกากลาง และสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก แอฟริกาตะวันออก ในประเทศเอธิโอเปียเคนยามาดากัสการ์มอริเชียส และแซมเบีย
- ในเอเชียใต้ พบรายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในระดับต่ำ ส่วนใหญ่พบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A (H3N2)
- ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบรายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในระดับต่ำ

ที่มา : องค์การอนามัยโลก

http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/


สถานการณ์ประเทศไทย



ที่มา : รายงาน 506 สำนักระบาดวิทยา

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในปี 2561 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 6 กรกฎาคม 2561 มีรายงานผู้ป่วยทั่วประเทศจำนวน 61,240 ราย อัตราป่วย 92.70 ต่อประชากรแสนคน มีผู้เสียชีวิต 7 ราย คิดเป็นอัตรามรณะ 0.01 ต่อประชากรแสนคน (จังหวัดนครราชสีมา 5 ราย จังหวัดร้อยเอ็ด 1 ราย และหนองคาย 1 ราย)จำนวนผู้ป่วยในภาพรวมมีแนวโน้มสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง และปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน

❖ จำแนกตามกลุ่มอายุ



ที่มา : รายงาน 506 สำนักระบาดวิทยา

การเกิดโรคไข้หวัดใหญ่จำแนกตามกลุ่มอายุพบว่า ส่วนใหญ่พบผู้ป่วยอยู่ในกลุ่มอายุ 0 - 4 ปี มีอัตราป่วยสูงสุดคือ 376.93 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 5 - 9 ปี มีอัตราป่วย 246.75 ต่อประชากรแสนคน และกลุ่มอายุ 10 - 14 ปี มีอัตราป่วย 124.32 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ จะเห็นได้ว่ากลุ่มผู้ป่วยที่มีอัตราป่วยสูงจะอยู่ในช่วงวัยเด็กและวัยรุ่น จึงต้องมีการให้ความสำคัญต่อการป้องกันควบคุมโรคในกลุ่มเด็ก และในสถานที่ที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มากมากขึ้น

❖ จำแนกรายภาค

ภาค	ผู้ป่วย (ราย)	ผู้ป่วยตาย (ราย)	อัตราป่วย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราตาย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราป่วยตาย (ร้อยละ)
กลาง	27244	0	163.93	0.00	0.00
เหนือ	16403	0	132.08	0.00	0.00
ใต้	6044	0	64.50	0.00	0.00
ตะวันออกเฉียงเหนือ	11549	7	52.57	0.03	0.06

ที่มา : รายงาน 506 สำนักระบาดวิทยา

❖ จำแนกตามอัตราป่วยรายจังหวัด 5 อันดับ

อันดับ	จังหวัด	จำนวนผู้ป่วย	อัตราป่วย
1	พะเยา	1248	261.01
2	กรุงเทพมหานคร	15109	265.79
3	อุดรธานี	918	200.59
4	ลำพูน	744	183.27
5	ลำปาง	1342	179.48

ที่มา : รายงาน 506 สำนักระบาดวิทยา

การกระจายของการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่รายจังหวัด พบว่าจังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ พะเยา อัตราป่วย 261.01 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ กรุงเทพมหานคร อัตราป่วย 265.79 ต่อประชากรแสนคน อุตรดิตถ์ อัตราป่วย 200.59 ต่อประชากรแสนคน ลำพูน และลำปาง อัตราป่วย 183.27 และ 179.48 ต่อแสนประชากร ตามลำดับ


❖ จำแนกตามเครือข่ายบริการและกรุงเทพมหานคร




ที่มา : รายงาน 506 สำนักระบาดวิทยา

จำแนกตามเขตบริการสุขภาพและกรุงเทพมหานคร พบว่า กรุงเทพมหานครมีอัตราป่วยสูงสุด คือ 265.79 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ เขตบริการสุขภาพที่ 2 และเขตบริการสุขภาพที่ 11 มีอัตราป่วย 88.71 และ 87.57 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ

❖ เหตุการณ์พบผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เป็นกลุ่มก้อน



ที่มา : โปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด



เหตุการณ์พบผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เป็นกลุ่มก้อน
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 – 6 กรกฎาคม 2561 พบใน
เรือนจำ 12 เหตุการณ์ โรงเรียน 7 เหตุการณ์ ค่ายทหาร 3
เหตุการณ์ และที่พัก 3 เหตุการณ์ ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีการ
รวมตัวของคนหมู่มาก