

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่

สถานการณ์ต่างประเทศ

องค์การอนามัยโลกรายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในภาพรวมทั่วโลก ณ วันที่ 17 กันยายน 2561 โดยภาพรวมในขณะนี้ เขตอบอุ่นของซีกโลกใต้ มีรายงานว่า โรคไข้หวัดใหญ่มักรุนแรงเพิ่มขึ้นในอเมริกาใต้ และเริ่มลดลงในแอฟริกาใต้ โรคไข้หวัดใหญ่อยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์ตามฤดูกาลในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ เขตอบอุ่นของซีกโลกเหนือ มีรายงานการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่ลดลงในประเทศแถบอเมริกาเหนือ โดยส่วนใหญ่แล้ว ทั่วโลกตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลชนิด A เป็นสาเหตุหลัก องค์การอนามัยโลกแนะนำให้มามาตรการจัดการที่เหมาะสมเพื่อควบคุมการติดเชื้อ และฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเสี่ยง รายละเอียดสถานการณ์ในแต่ละภูมิภาค ดังต่อไปนี้


- เขตอเมริกาใต้ มีรายงานโรคไข้หวัดใหญ่ในหลายประเทศในภูมิภาคย่อย
 - ประเทศอาร์เจนตินา รายงานการติดเชื้อโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARI) และการติดเชื้อไวรัสที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียในระบบทางเดินหายใจ (Respiratory syncytial virus หรือ RSV) มีแนวโน้มลดลง ในขณะที่การอัตราการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้นในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา
 - ประเทศชิลี และปารากวัย ตัวบ่งชี้การโรคทางเดินหายใจยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่ตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด A (H3N2) และเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด B ในขณะที่ RSV ลดลง
 - ประเทศอุรุกวัย มีรายงานการติดเชื้อโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARI) และอัตราการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่ สูงกว่าเกณฑ์ตามฤดูกาล โดยส่วนใหญ่พบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล
 - ประเทศบราซิล รายงานการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่ลดลง
- แอฟริกาใต้ มีรายงานการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด B (ทั้งสองสายพันธุ์) อย่างต่อเนื่อง ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา
- เขตโอเชียเนีย สถานการณ์ไข้หวัดใหญ่อยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์ตามฤดูกาล ทั้งในประเทศออสเตรเลีย และประเทศนิวซีแลนด์ มีรายงานพบผู้ป่วยกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ILI) ในหมู่เกาะแปซิฟิก โดยส่วนใหญ่พบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A (H1N1) pdm09

- แบททะเลแคริบเบียน การตรวจพบโรคไข้หวัดใหญ่ และการติดเชื้อโรคทางเดินหายใจ RSV ยังคงพบอยู่ทั่วไป ประเทศในอเมริกากลาง สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่อยู่ในระดับต่ำ ในขณะที่ RSV เพิ่มขึ้นในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา สาธารณรัฐกัวเตมาลา อัตราการติดเชื้อของโรคไข้หวัดใหญ่ลดลง และกลับสู่ระดับต่ำกว่าเกณฑ์ตามฤดูกาล และมีรายงาน RSV เพิ่มขึ้น ทั้งในสาธารณรัฐกัวเตมาลา และประเทศปานามา
- ประเทศเขตร้อนของทวีปอเมริกาใต้ มีรายงานการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ และ รายงานการติดเชื้อโรคทางเดินหายใจ RSV ในหลายประเทศ ประเทศเปรู ตีวงชี้ว่าการโรคทางเดินหายใจเชื้อไข้หวัดใหญ่ชนิด A (H1N1) pdm09 ลดลง ในขณะที่ อัตราการติดเชื้อโรคทางเดินหายใจ RSV เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- แอฟริกาตะวันตก และแอฟริกากลาง สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ อยู่ในระดับต่ำ ในประเทศที่มีการรายงาน แอฟริกาตะวันออก พบว่ารายงานโรคไข้หวัดใหญ่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในสัปดาห์ที่ 31 ประเทศเคนยา มีการรายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ลดลง ส่วนใหญ่ตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A
- เอเชียเขตร้อน ในเอเชียใต้ สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในระดับต่ำ ในประเทศที่มีการรายงาน
- เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่อยู่ในระดับต่ำ ในประเทศที่มีการรายงาน ประเทศกัมพูชา มีรายงานการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด A (H1N1) pdm09 และ สายพันธุ์ B (Yamagata lineage) อย่างต่อเนื่อง ประเทศฟิลิปปินส์ รายงานการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด A (H3N2) มีแนวโน้มลดลง ประเทศลาว ระดับการติดเชื้อโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARI) ยังคงสูงกว่าช่วง 5 ฤดูกาลของโรคไข้หวัดใหญ่ที่ผ่านมา โดยส่วนใหญ่พบในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี

ที่มา : องค์การอนามัยโลก

http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/2018_09_17_surveillance_update_324.pdf?ua=1


สถานการณ์ประเทศไทย



ที่มา : รายงาน 506 สำนักระบาดวิทยา

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในปี 2561 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 28 กันยายน 2561 มีรายงานผู้ป่วยทั่วประเทศจำนวน 122,603 ราย อัตราป่วย 185.59 ต่อประชากรแสนคน มีผู้เสียชีวิต 20 ราย คิดเป็นอัตรามรณะ 0.03 ต่อประชากรแสนคน (จังหวัดนครราชสีมา 9 ราย จังหวัดร้อยเอ็ด 1 ราย จังหวัดหนองคาย 1 ราย จังหวัดสุรินทร์ 2 ราย จังหวัดนครสวรรค์ 1 ราย จังหวัดพิจิตร 2 ราย จังหวัดนครปฐม 1 ราย จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 ราย และกรุงเทพมหานคร 2 ราย) จำนวนผู้ป่วยในภาพรวมมีแนวโน้มสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง แต่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน

❖ จำแนกตามกลุ่มอายุ



ที่มา : รายงาน 506 สำนักระบาดวิทยา

การเกิดโรคไข้หวัดใหญ่จำแนกตามกลุ่มอายุพบว่า ส่วนใหญ่พบผู้ป่วยอยู่ในกลุ่มอายุ 0 - 4 ปี มีอัตราป่วยสูงสุดคือ 840.47 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 5 - 9 ปี มีอัตราป่วย 562.15 ต่อประชากรแสนคน และกลุ่มอายุ 10 - 14 ปี มีอัตราป่วย 263.26 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ จะเห็นได้ว่ากลุ่มผู้ป่วยที่มีอัตราป่วยสูงจะอยู่ในช่วงวัยเด็กและวัยรุ่น จึงต้องมีการให้ความสำคัญต่อการป้องกันควบคุมโรคในกลุ่มเด็ก และในสถานที่ที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มากมากขึ้น

❖ จำแนกรายภาค

ภาค	ผู้ป่วย (ราย)	ผู้ป่วยตาย (ราย)	อัตราป่วย (ต่อประชากรแสน คน)	อัตราตาย (ต่อประชากรแสน คน)	อัตราป่วยตาย (ร้อยละ)
กลาง	55,645	3	334.83	0.02	0.01
เหนือ	29,373	3	236.52	0.02	0.01
ตะวันออกเฉียงเหนือ	28,760	14	130.92	0.06	0.05
ใต้	8,825	0	94.18	0.00	0.00

ที่มา : รายงาน 506 สำนักระบาดวิทยา

❖ จำแนกตามอัตราป่วยรายจังหวัด 5 อันดับ

อันดับ	จังหวัด	จำนวนผู้ป่วย	อัตราป่วย
1	กรุงเทพมหานคร	28,853	507.57
2	เชียงใหม่	7,904	453.91
3	ระยอง	2,926	414.61
4	พิษณุโลก	2,974	343.59
5	อุบลราชธานี	6,221	333.33

ที่มา : รายงาน 506 สำนักระบาดวิทยา

การกระจายของการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่รายจังหวัด พบว่าจังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร อัตราป่วย 507.57 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ เชียงใหม่ อัตราป่วย 453.91 ต่อประชากรแสนคน ระยอง อัตราป่วย 414.61 ต่อประชากรแสนคน พิษณุโลก และอุบลราชธานี อัตราป่วย 343.59 และ 333.33 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ

❖ จำแนกตามเครือข่ายบริการและกรุงเทพมหานคร




ที่มา : รายงาน 506 สำนักระบาดวิทยา

จำแนกตามเขตบริการสุขภาพและกรุงเทพมหานคร พบว่า กรุงเทพมหานคร มีอัตราป่วยสูงสุด คือ 507.57 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ เขตบริการสุขภาพที่ 1 และเขตบริการสุขภาพที่ 6 มีอัตราป่วย 283.33 และ 203.58 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ

❖ เหตุการณ์พบผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เป็นกลุ่มก้อน



ที่มา : โปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด



เหตุการณ์พบผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เป็นกลุ่มก้อน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 – 28 กันยายน 2561 พบ 65 เหตุการณ์ ใน 37 จังหวัด โดยพบใน เรือนจำ 29 เหตุการณ์ โรงเรียน 17 เหตุการณ์ ค่ายทหาร 4 เหตุการณ์ ที่พัก 11 เหตุการณ์ วัด 1 เหตุการณ์ โรงพยาบาล 1 เหตุการณ์ สถานที่ทำงาน 1 เหตุการณ์ และสถานสงเคราะห์ 1 เหตุการณ์ ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีการรวมตัวของคนหมู่มาก