

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่


สถานการณ์ต่างประเทศ

องค์การอนามัยโลกรายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในภาพรวมทั่วโลก ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 โดยภาพรวมทั่วโลก มีรูปแบบการแพร่กระจายเชื้อคล้ายคลึงกัน โรคไข้หวัดใหญ่ในซีกโลกเหนือ ยกเว้นบางประเทศในยุโรปตะวันออกเข้าสู่ช่วงไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล เขตร้อนของอเมริกา และเขตอบอุ่นซีกโลกใต้ รายงานโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้น แต่ยังคงต่ำกว่าไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล โดยส่วนใหญ่ทั่วโลกพบไข้หวัดใหญ่ชนิด A และ ชนิด B ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงปัจจุบันมีหลายประเทศที่กำลังเข้าสู่ช่วงฤดูกาลของไข้หวัดใหญ่ องค์การอนามัยโลกจึงแนะนำให้มีการจัดการที่เหมาะสมเพื่อควบคุมการติดเชื้อ และฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเสี่ยง รายละเอียดสถานการณ์ในแต่ละภูมิภาค ดังต่อไปนี้

- ในอเมริกาเหนือ สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งในแคนาดาและสหรัฐอเมริกา ส่วนใหญ่พบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A และ B ในแม็กซิโก มีรายงานว่าโรคไข้หวัดใหญ่ลดลง และเป็นไข้หวัดตามฤดูกาล
- ในยุโรป สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่โดยทั่วไปลดลงเป็นไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ยกเว้นบางประเทศในยุโรปตะวันออก รวมถึงภูมิภาคตะวันตกของสหพันธรัฐรัสเซีย ที่มีรายงานไข้หวัดใหญ่สูงกว่าเกณฑ์
- ในเอเชียตะวันตก เอเชียตะวันออกและเอเชียกลาง พบรายงานสถานการณ์ไข้หวัดใหญ่ลดลงทั่วทั้งภูมิภาค ส่วนใหญ่พบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด A (H1N1) pdm09 และพบรายงานไข้หวัดใหญ่ในมองโกเลีย
- ในแอฟริกากลาง และแอฟริกาตะวันตก พบรายงานโรคไข้หวัดใหญ่ในระดับต่ำ ยกเว้นประเทศ ไวออร์โคสต์ ที่ตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ B ในแอฟริกาตะวันออก พบรายงานโรคไข้หวัดใหญ่ในระดับต่ำ แต่พบรายงานสถานการณ์ไข้หวัดใหญ่ ระดับปานกลาง ในสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย

ที่มา : องค์การอนามัยโลก


สถานการณ์ประเทศไทย



ที่มา : รายงาน 506 สำนักระบาดวิทยา

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในปี 2561 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 18 พฤษภาคม 2561 มีรายงานผู้ป่วยทั่วประเทศจำนวน 46,420 ราย อัตราป่วย 70.27 ต่อประชากรแสนคน มีผู้เสียชีวิต 5 ราย คิดเป็นอัตรายาย 0.01 ต่อประชากรแสนคน (จังหวัดนครราชสีมา 3 ราย จังหวัดร้อยเอ็ด 1 ราย และจังหวัดอุดรธานี 1 ราย) จำนวนผู้ป่วยมีแนวโน้มลดลง ต่ำกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลังในช่วงเวลาเดียวกัน

❖ จำแนกตามกลุ่มอายุ



ที่มา : รายงาน 506 สำนักระบาดวิทยา

การเกิดโรคไข้หวัดใหญ่จำแนกตามกลุ่มอายุพบว่า ส่วนใหญ่พบผู้ป่วยอยู่ในกลุ่มอายุ 0 - 4 ปี มีอัตราป่วยสูงสุด คือ 273.38 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 5 - 9 ปี มีอัตราป่วย 187.51 ต่อประชากรแสนคน และกลุ่มอายุ 10 - 14 ปี มีอัตราป่วย 93.98 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ จะเห็นได้ว่ากลุ่มผู้ป่วยที่มีอัตราป่วยสูงจะอยู่ในช่วงวัยเด็กและวัยเรียน จึงต้องมีการให้ความสำคัญต่อการป้องกันควบคุมโรคในกลุ่มเด็ก และในสถานที่ที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มากมากขึ้น

❖ จำแนกรายภาค

ภาค	ผู้ป่วย (ราย)	ผู้ป่วยตาย (ราย)	อัตราป่วย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราตาย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราป่วยตาย (ร้อยละ)
กลาง	20,965	0	126.15	0.00	0.00
เหนือ	13,609	0	109.58	0.00	0.00
ใต้	5,146	0	54.92	0.00	0.00
ตะวันออกเฉียงเหนือ	6,700	5	30.50	0.02	0.07

ที่มา : รายงาน 506 สำนักระบาดวิทยา


❖ จำแนกตามอัตราป่วยรายจังหวัด 5 อันดับ

อันดับ	จังหวัด	จำนวนผู้ป่วย	อัตราป่วย
1	พะเยา	1,172	245.11
2	กรุงเทพมหานคร	12,184	214.34
3	ลำพูน	685	168.74
4	อุดรดิตถ์	727	158.86
5	ลำปาง	1,132	151.40

ที่มา : รายงาน 506 สำนักระบาดวิทยา

การกระจายของการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่รายจังหวัด พบว่าจังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ พะเยา อัตราป่วย 245.11 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ กรุงเทพมหานคร อัตราป่วย 214.34 ต่อประชากรแสนคน ลำพูน อัตราป่วย 168.74 ต่อประชากรแสนคน อุดรดิตถ์ และลำปาง อัตราป่วย 158.86 และ 151.40 ต่อแสนประชากรตามลำดับ


❖ จำแนกตามเครือข่ายบริการและกรุงเทพมหานคร




ที่มา : รายงาน 506 สำนักระบาดวิทยา

จำแนกตามเขตบริการสุขภาพและกรุงเทพมหานคร พบว่า กรุงเทพมหานครมีอัตราป่วยสูงสุด คือ 214.34 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ เขตบริการสุขภาพที่ 11 และเขตบริการสุขภาพที่ 2 มีอัตราป่วย 74.91 และ 64.08 ต่อประชากรแสนคนตามลำดับ

❖ เหตุการณ์พบผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เป็นกลุ่มก้อน



ที่มา : โปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด



เหตุการณ์พบผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เป็นกลุ่มก้อนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 - 18 พฤษภาคม 2561 พบใน โรงเรียน 7 เหตุการณ์ เรือนจำ 7 เหตุการณ์ ค่ายทหาร 3 เหตุการณ์ และวัด 1 เหตุการณ์ ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีการรวมตัวของคนหมู่มาก