

เอกสารหมายเลข 3

รหัสชนิดวัคซีนในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

รหัสที่ใช้บันทึก (มาตรฐาน สนย.)	รหัสวัคซีน	ชื่อวัคซีนภาษาอังกฤษ	ชื่อวัคซีนภาษาไทย	ประเภท	อายุ(เดือน)	ชื่อโรคที่ป้องกัน	รหัส ICD_10_TM
010	010	BCG	บีซีจี	ฉีด	0	วัณโรค	Z23.2
011	011	BCGs	บีซีจีเอส	ฉีด	ป1	วัณโรคกระดูก	Z23.2
021	021	dTs1	ดีทีเอส1	ฉีด	ป1	คอตีบ,บาดทะยัก	Z23.5,Z23.6
022	022	dTs2	ดีทีเอส 2	ฉีด	ป1	คอตีบ,บาดทะยัก	Z23.5,Z23.6
023	023	dTs3	ดีทีเอส 3	ฉีด	ป2	คอตีบ,บาดทะยัก	Z23.5,Z23.6
024	024	dTs4	ดีทีเอส 4	ฉีด	ป6	คอตีบ,บาดทะยัก	Z23.5,Z23.6
031	031	DTP1	ดีทีพี1	ฉีด	2	คอตีบ,ไอกรน,บาดทะยัก	Z27.1
032	032	DTP2	ดีทีพี2	ฉีด	4	คอตีบ,ไอกรน,บาดทะยัก	Z27.1
033	033	DTP3	ดีทีพี3	ฉีด	6	คอตีบ,ไอกรน,บาดทะยัก	Z27.1
034	034	DTP4	ดีทีพี กระตุ้น 1	ฉีด	18	คอตีบ,ไอกรน,บาดทะยัก	Z27.1
035	035	DTP5	ดีทีพี กระตุ้น 2	ฉีด	48	คอตีบ,ไอกรน,บาดทะยัก	Z27.1
041	041	HBV1	ตับอักเสบบี 1	ฉีด	0	ตับอักเสบบี	Z24.6
042	042	HBV2	ตับอักเสบบี 2	ฉีด	2	ตับอักเสบบี	Z24.6
043	043	HBV3	ตับอักเสบบี3	ฉีด	6	ตับอักเสบบี	Z24.6
051	051	JE1	ใช้สมองอักเสบเจอี 1	ฉีด	18	ใช้สมองอักเสบ	Z24.1
052	052	JE2	ใช้สมองอักเสบเจอี 2	ฉีด	18	ใช้สมองอักเสบ	Z24.1
053	053	JE3	ใช้สมองอักเสบเจอี 3	ฉีด	30	ใช้สมองอักเสบ	Z24.1
061	061	MEASLES/MMR	หัด คางทูม หัดเยอรมัน	ฉีด	9		Z27.4
072	072	MMRs	หัด คางทูม หัดเยอรมัน	ฉีด	ป1		Z27.4

รหัสที่ใช้บันทึก (มาตรฐาน สนย.)	รหัสวัคซีน	ชื่อวัคซีนภาษาอังกฤษ	ชื่อวัคซีนภาษาไทย	ประเภท	อายุ(เดือน)	ชื่อโรคที่ป้องกัน	รหัส ICD_10_TM
081	081	OPV1	โอฟีวี 1	กิน	2	โปลิโอ	Z24.0
082	082	OPV2	โอฟีวี 2	กิน	4	โปลิโอ	Z24.0
083	083	OPV3	โอฟีวี 3	กิน	6	โปลิโอ	Z24.0
084	084	OPV4	โอฟีวี กระตุ้น 1	กิน	18	โปลิโอ	Z24.0
085	085	OPV5	โอฟีวี กระตุ้น 2	กิน	48	โปลิโอ	Z24.0
086	086	OPVs1	โอฟีวีเอส 1	กิน	ป1	โปลิโอ	Z24.0
087	087	OPVs2	โอฟีวีเอส2	กิน	ป1	โปลิโอ	Z24.0
088	088	OPVs3	โอฟีวีเอส 3	กิน	ป2	โปลิโอ	Z24.0
089	089	OPVC	โอฟีวีซี	กิน	ให้การรณรงค์	โปลิโอ	Z24.0
201	201	dTANC 1	ดีทีเอเอ็นซี เข็ม 1	ฉีด	สำหรับหญิงมีครรภ์	บาดทะยัก คอตีบ สำหรับคนท้อง	Z23.5,Z23.6
202	202	dTANC 2	ดีทีเอเอ็นซี เข็ม 2	ฉีด	สำหรับหญิงมีครรภ์	บาดทะยัก คอตีบ สำหรับคนท้อง	Z23.5,Z23.6
203	203	dTANC 3	ดีทีเอเอ็นซี เข็ม 3	ฉีด	สำหรับหญิงมีครรภ์	บาดทะยัก คอตีบ สำหรับคนท้อง	Z23.5,Z23.6
204	204	dTANC 4	ดีทีเอเอ็นซี เข็ม 4 (กระตุ้น)	ฉีด	สำหรับหญิงมีครรภ์	บาดทะยัก คอตีบ สำหรับคนท้อง	Z23.5,Z23.6
205	205	dTANC 5	ดีทีเอเอ็นซี เข็ม 5 (กระตุ้น)	ฉีด	สำหรับหญิงมีครรภ์	บาดทะยัก คอตีบ สำหรับคนท้อง	Z23.5,Z23.6
101	101	TT1/	ทีที/ดีที เข็ม 1	ฉีด	บาดแผล	บาดทะยัก ไม่ตามอายุ	Z23.5
102	102	TT2/	ทีที /ดีที เข็ม 2	ฉีด	บาดแผล	บาดทะยัก ไม่ตามอายุ	Z23.5
103	103	TT3/	ทีที/ดีที เข็ม 3	ฉีด	บาดแผล	บาดทะยัก ไม่ตามอายุ	Z23.5
104	104	TT4/	ทีที/ดีที เข็ม 4 (กระตุ้น)	ฉีด	บาดแผล	บาดทะยัก ไม่ตามอายุ	Z23.5
105	105	TT5/	ทีที/ดีที เข็ม 5 (กระตุ้น)	ฉีด	บาดแผล	บาดทะยัก ไม่ตามอายุ	Z23.5
106	106	dT1	ทีที/ดีที เข็ม 1	ฉีด	บาดแผล	บาดทะยัก ไม่ตามอายุ	Z23.5
107	107	dT2	ทีที /ดีที เข็ม 2	ฉีด	บาดแผล	บาดทะยัก ไม่ตามอายุ	Z23.5
108	108	dT3	ทีที/ดีที เข็ม 3	ฉีด	บาดแผล	บาดทะยัก ไม่ตามอายุ	Z23.5
109	109	dT4*	ทีที/ดีที เข็ม 4 (กระตุ้น)	ฉีด	บาดแผล	บาดทะยัก ไม่ตามอายุ	Z23.5
110	110	dT5 *	ทีที/ดีที เข็ม 5 (กระตุ้น)	ฉีด	บาดแผล	บาดทะยัก ไม่ตามอายุ	Z23.5

รหัสที่ใช้บันทึก (มาตรฐาน สนย.)	รหัสวัคซีน	ชื่อวัคซีนภาษาอังกฤษ	ชื่อวัคซีนภาษาไทย	ประเภท	อายุ(เดือน)	ชื่อโรคที่ป้องกัน	รหัส ICD_10_TM
091	091	DTPHB 1	ดีทีพีดับอักเสบบี 1	เข็ม	2	คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก เพิ่มดับอักเสบบี	Z27.1,Z24.6
092	092	DTPHB 2	ดีทีพีดับอักเสบบี 2	เข็ม	4	คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก เพิ่มดับอักเสบบี	Z27.1,Z24.6
093	093	DTPHB 3	ดีทีพีดับอักเสบบี 3	เข็ม	6	คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก เพิ่มดับอักเสบบี	Z27.1,Z24.6
111	111	Rabies Vaccine 1	วัคซีนพิษสุนัขบ้า	เข็ม		สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดที่บ้า	Z24.2
112	112	Rabies Vaccine 2	วัคซีนพิษสุนัขบ้า	เข็ม		สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดที่บ้า	Z24.2
113	113	Rabies Vaccine 3	วัคซีนพิษสุนัขบ้า	เข็ม		สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดที่บ้า	Z24.2
114	114	Rabies Vaccine 4	วัคซีนพิษสุนัขบ้า	เข็ม		สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดที่บ้า	Z24.2
115	115	Rabies Vaccine 5	วัคซีนพิษสุนัขบ้า	เข็ม		สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดที่บ้า	Z24.2
815	815	Flu	ไข้หวัดใหญ่	เข็ม		ไข้หวัดใหญ่	Z25.1
816	816	Need for immunization against influenza	ไข้หวัดใหญ่2009	เข็ม		ไข้หวัดใหญ่ 2009	Z25.1 (เพิ่มเติมมค. 53)

คำอธิบาย

- นักเรียนได้รับ BCGs/dTs/OPVs ป1.และ ป2 ขึ้นกับประวัติการได้รับวัคซีนBCG/ DTP/OPV ในอดีต
- ในกรณีที่ไม่ได้รับวัคซีน DTP มาเลยต้องได้ dTs 3 ครั้ง (ป1 ได้รับ dTs 2 ครั้ง, ป2
- ป6 ต้องได้ dTs ทุกคน 1 ครั้ง
- JE เข็มที่ 2 ห่างจากเข็มแรก 1 เดือน
- * TT4/dT4 กรณีที่ได้รับ TT หรือ dT ครบ 3 ครั้งมาก่อนเกิน 10 ปี
- * TT4/dT5 กรณีที่ได้รับ TT หรือ dT ครบ 4 ครั้งมาก่อนเกิน 10 ปี

ความหมาย

- dTs (s คือนักเรียน)
- OPVC (C คือ Campaign)
- dTANC (ANC คือ หญิงมีครรภ์)

ที่มา

- กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน กรมควบคุมโรค
- สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ปรับเมื่อ วันที่ 1 กันยายน 2552

รหัสวัคซีนที่อยู่นอกแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

เอกสารหมายเลข 4

รหัสที่ใช้บันทึก (มาตรฐาน สนย.)	รหัสวัคซีน	ชื่อวัคซีนภาษาอังกฤษ	ชื่อวัคซีนภาษาไทย	ประเภท	อายุ(เดือน)	ชื่อโรคที่ป้องกัน	รหัส ICD_10 _TM
C11	C11	Cholera+ETEC1	อหิวาตกโรค+อีโคไล1	กิน	- อายุ 2-6 ปี ให้ 3 โด๊ส	โรคอหิวาตกโรคและอุจจาระร่วงจากเชื้อ อีโคไล	Z23.0,Z23.8
C12	C12	Cholera+ETEC2	อหิวาตกโรค+อีโคไล2		แต่ละโด๊สห่างกัน 1-6		Z23.0,Z23.8
C13	C13	Cholera+ETEC3	อหิวาตกโรค+อีโคไล3		สัปดาห์ และ กระตุ้น		Z23.0,Z23.8
C14	C14	Cholera+ETEC4	อหิวาตกโรค+อีโคไล4 (กระตุ้น)		หลังได้รับ โด๊สสุดท้าย 6 เดือน		Z23.0,Z23.8
					- อายุ 6 ปี ขึ้นไป ให้ 2 โด๊ส ห่างกัน 1-6 สัปดาห์ และกระตุ้น หลังได้รับ โด๊ส สุดท้าย 2 ปี		
D11	D11	DTP-Hib 1	ดีทีพีฮิบ1	ฉีด	2 เดือน	โรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน- เยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อ ฮิโมฟิลุสอินฟลูเอนเซ่ทัยป์บี	Z27.1,Z24.1
D12	D12	DTP-Hib 2	ดีทีพีฮิบ2		4 เดือน		Z27.1,Z24.1
D13	D13	DTP-Hib 3	ดีทีพีฮิบ3		6 เดือน		Z27.1,Z24.1
D14	D14	DTP-Hib 4	ดีทีพีฮิบ4		12-18 เดือน		Z27.1,Z24.1
D21	D21	DTP-HB+Hib 1	ดีทีพีดับอักเสบบีฮิบ1	ฉีด	2 เดือน	โรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน- ดับอักเสบบี-เยื่อหุ้มสมองอักเสบจาก เชื้อฮิโมฟิลุสอินฟลูเอนเซ่ ทัยป์บี	Z27.1,Z24.6,Z24.1
D22	D22	DTP-HB+Hib 2	ดีทีพีดับอักเสบบีฮิบ2		4 เดือน		Z27.1,Z24.6,Z24.1
D23	D23	DTP-HB+Hib 3	ดีทีพีดับอักเสบบีฮิบ3		6 เดือน		Z27.1,Z24.6,Z24.1
D24	D24	DTP-HB+Hib 4	ดีทีพีดับอักเสบบีฮิบ4		12-18 เดือน		Z27.1,Z24.6,Z24.1

รหัสที่ใช้บันทึก (มาตรฐาน สนย.)	รหัสวัคซีน	ชื่อวัคซีนภาษาอังกฤษ	ชื่อวัคซีนภาษาไทย	ประเภท	อายุ(เดือน)	ชื่อโรคที่ป้องกัน	รหัส ICD_10_TM
D31	D31	DTP-IPV 1	ดีทีพีไอพีวี1		2 เดือน	โรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-โปลิโอ	Z27.3
D32	D32	DTP-IPV 2	ดีทีพีไอพีวี2		4 เดือน		Z27.3
D33	D33	DTP-IPV 3	ดีทีพีไอพีวี3	ฉีด	6 เดือน		Z27.3
D34	D34	DTP-IPV 4	ดีทีพีไอพีวี4		1 ปีครึ่ง		Z27.3
D35	D35	DTP-IPV 5	ดีทีพีไอพีวี5		4 ปี		Z27.3
D41	D41	DTP-IPV-Hib 1	ดีทีพีไอพีวีฮิบ1		2 เดือน	โรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-โปลิโอ- เยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อ ฮิโมฟิลุสอินฟลูเอนเซ่ ทัยป์บี	Z27.3,Z24.1
D42	D42	DTP-IPV-Hib 2	ดีทีพีไอพีวีฮิบ2		4 เดือน		Z27.3,Z24.1
D43	D43	DTP-IPV-Hib 3	ดีทีพีไอพีวีฮิบ3		6 เดือน		Z27.3,Z24.1
D44	D44	DTP-IPV-Hib 4	ดีทีพีไอพีวีฮิบ4	ฉีด	1 ปีครึ่ง		Z27.3,Z24.1
D45	D45	DTP-IPV-Hib 5	ดีทีพีไอพีวีฮิบ5		4 ปี		Z27.3,Z24.1
D51	D51	DTP-IPV-HB-Hib1	ดีทีพีไอพีวีดับอักเสบบีฮิบ1		2 เดือน	โรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-โปลิโอ- ดับอักเสบบี-เยื่อหุ้มสมองอักเสบจาก เชื้อฮิโมฟิลุสอินฟลูเอนเซ่ ทัยป์บี	Z27.3,Z24.6,Z24.1
D52	D52	DTP-IPV-HB-Hib2	ดีทีพีไอพีวีดับอักเสบบีฮิบ2		4 เดือน		Z27.3,Z24.6,Z24.1
D53	D53	DTP-IPV-HB-Hib3	ดีทีพีไอพีวีดับอักเสบบีฮิบ3	ฉีด	6 เดือน		Z27.3,Z24.6,Z24.1
D54	D54	DTP-IPV-HB-Hib4	ดีทีพีไอพีวีดับอักเสบบีฮิบ4		1 ปีครึ่ง		Z27.3,Z24.6,Z24.1
D55	D55	DTP-IPV-HB-Hib5	ดีทีพีไอพีวีดับอักเสบบีฮิบ5		4 ปี		Z27.3,Z24.6,Z24.1
H11	H11	Hib1	ฮิบ1		2 เดือน	โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจาก เชื้อฮิโมฟิลุสอินฟลูเอนเซ่ ทัยป์บี	Z24.1
H12	H12	Hib2	ฮิบ2	ฉีด	4 เดือน		Z24.1
H13	H13	Hib3	ฮิบ3		6 เดือน		Z24.1
H14	H14	Hib4	ฮิบ4		12-18 เดือน		Z24.1

รหัสที่ใช้บันทึก (มาตรฐาน สนย.)	รหัสวัคซีน	ชื่อวัคซีนภาษาอังกฤษ	ชื่อวัคซีนภาษาไทย	ประเภท	อายุ(เดือน)	ชื่อโรคที่ป้องกัน	รหัส ICD_10 _TM
H21	H21	HA1	ตับอักเสเบอ1		ตั้งแต่อายุ 1 เดือนขึ้นไป	โรคตับอักเสเบอ	Z24.6
H22	H22	HA2	ตับอักเสเบอ2	ฉีด	ห่างจากเข็มแรกอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป		Z24.6
H31	H31	HB-HA1	ตับอักเสเบบี-ตับอักเสเบเอ1	ฉีด	-1-15 ปี ให้ 2 โด๊ส โด๊ส สองห่างจากโด๊สแรก อย่างน้อย 6-12 เดือน -16 ปีขึ้นไป ให้ 3 โด๊ส โด๊สสองห่างจากโด๊สแรกอย่างน้อย 1 เดือน และโด๊สสามห่างจากโด๊สสองอย่างน้อย 6 เดือน	โรคตับอักเสเบบี-ตับอักเสเบเอ	Z24.6
H32	H32	ตับอักเสเบบี-ตับอักเสเบเอ2	Z24.6				
H33	H33	ตับอักเสเบบี-ตับอักเสเบเอ3	Z24.6				
H41	H41	HPV1	เอชพีวี1	ฉีด	ตั้งแต่อายุ 9 ปีขึ้นไป	โรคมะเร็งปากมดลูกจากเชื้อไวรัสฮิวแมนแพปพิลโลมา	Z25.8
H42	H42	HPV2	เอชพีวี2		ห่างจากโด๊สแรก 1-2 เดือน		Z25.8
H43	H43	HPV3	เอชพีวี3		โด๊สสามห่างจากโด๊สสอง 4-5 เดือน		Z25.8

รหัสที่ใช้บันทึก (มาตรฐาน สนย.)	รหัสวัคซีน	ชื่อวัคซีนภาษาอังกฤษ	ชื่อวัคซีนภาษาไทย	ประเภท	อายุ(เดือน)	ชื่อโรคที่ป้องกัน	รหัส ICD_10 _TM
I11	I11	IPV1	ไอพีวี1		2 เดือน	โรคโปลิโอ	Z24.0
I12	I12	IPV2	ไอพีวี2		4 เดือน		Z24.0
I13	I13	IPV3	ไอพีวี3	ฉีด	6 เดือน		Z24.0
I14	I14	IPV4	ไอพีวี4		1 ปีครึ่ง		Z24.0
I15	I15	IPV5	ไอพีวี5		4 ปี		Z24.0
J11	J11	JE1 : Lived attenuated	เจอีเชื้อเป็น1		9 เดือนขึ้นไป	โรคไข้มองอักเสบเจอี	Z24.1
J12	J12	JE2 : Lived attenuated	เจอีเชื้อเป็น2	ฉีด	ห่างจากเข็มแรกอย่างน้อย 3 เดือน		Z24.1
M11	M11	MMRV1	เอ็มเอ็มอาร์วี1	ฉีด	ตั้งแต่อายุ 9 เดือน – 12 ปี	โรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน-อีสุกอีใส	Z27.4,Z25.8
M12	M12	MMRV2	เอ็มเอ็มอาร์วี2		ฉีดกระตุ้นห่างจากโดสแรกอย่างน้อย 6 สัปดาห์		Z27.4,Z25.8
M21	M21	Meningococcal ACYW	ไข้กาฬหลังแอ่น ACYW135	ฉีด	อายุตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป	โรคไข้กาฬหลังแอ่นจากเชื้อ ACYW135	Z23.8
M31	M31	Meningococcal AC	ไข้กาฬหลังแอ่น AC	ฉีด	อายุตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป	โรคไข้กาฬหลังแอ่นจากเชื้อ AC	Z23.8
P11	P11	PCV-Hib1	พีซีวีฮิบ1		2 เดือน	โรคจากการติดเชื้อเสตริปโตคอคคัส นิวโมเนีย - เยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อ ฮีโมฟิลุสอินฟลูเอนเซ่ ทัยป์บี	Z23.8,Z24.1
P12	P12	PCV-Hib2	พีซีวีฮิบ2	ฉีด	4 เดือน		Z23.8,Z24.1
P13	P13	PCV-Hib3	พีซีวีฮิบ3		6 เดือน		Z23.8,Z24.1
P14	P14	PCV-Hib4	พีซีวีฮิบ4		12-18 เดือน		Z23.8,Z24.1

รหัสที่ใช้บันทึก (มาตรฐาน สนย.)	รหัสวัคซีน	ชื่อวัคซีนภาษาอังกฤษ	ชื่อวัคซีนภาษาไทย	ประเภท	อายุ(เดือน)	ชื่อโรคที่ป้องกัน	รหัส ICD_10_TM
P21	P21	PCV1	พีซีวี1		2 เดือน	โรคจากการติดเชื้อเสตริปโตคอคคัส นิวโมเนีย	Z23.8
P22	P22	PCV2	พีซีวี2	ฉีด	4 เดือน		Z23.8
P23	P23	PCV3	พีซีวี3		6 เดือน		Z23.8
P24	P24	PCV4	พีซีวี4		12-18 เดือน		Z23.8
P31	P31	PS23 - 1	พีเอส23-1		อายุมากกว่า 2 ปี	โรคจากการติดเชื้อเสตริปโตคอคคัส นิวโมเนีย	Z23.8
P32	P32	PS23 - 2	พีเอส23-2	ฉีด	ห่างจากครั้งแรก 3-5 ปี		Z23.8
R11	R11	RV2-1	โรต้า2-1		6-20 สัปดาห์	โรคอุจจาระร่วงจากเชื้อไวรัสโรต้า	Z25.8
R12	R12	RV2-2	โรต้า2-2	กิน	ห่างจากโดสแรกอย่างน้อย 4 สัปดาห์ แต่ โดสที่ 2 อายุไม่เกิน 8 เดือน		Z25.8
R21	R21	RV3-1	โรต้า3-1		6-15 สัปดาห์	โรคอุจจาระร่วงจากเชื้อไวรัสโรต้า	Z25.8
R22	R22	RV3-2	โรต้า3-2	กิน	ห่างกันอย่างน้อย 4 สัปดาห์ โดสสุดท้าย		Z25.8
R23	R23	RV3-3	โรต้า3-3		อายุไม่เกิน 8 เดือน		Z25.8
T11	T11	Tdap1	ทีดีเอพี1	ฉีด	ตั้งแต่อายุ 4 ปี ขึ้นไป	โรคบาดทะยัก- คอตีบ-ไอกรน	Z27.1
T12	T12	Tdap2	ทีดีเอพี2	ฉีด	ใช้ฉีดกระตุ้น	โรคบาดทะยัก- คอตีบ-ไอกรน	Z27.1
T21	T21	Ty inactivated vaccin	ทัยฟอยด์เชื้อตาย	ฉีด	อายุตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป กระตุ้นได้ทุก 2 ปี	โรคไข้ทัยฟอยด์	Z23.1

รหัสที่ใช้บันทึก (มาตรฐาน สนย.)	รหัสวัคซีน	ชื่อวัคซีนภาษาอังกฤษ	ชื่อวัคซีนภาษาไทย	ประเภท	อายุ(เดือน)	ชื่อโรคที่ป้องกัน	รหัส ICD_10_TM
T31	T31	Ty 1 : live attenuated	ทัยฟอยด์เชื้อเป็น1	กิน	อายุตั้งแต่ 6 ปี ขึ้นไป ให้ 3 โด๊ส กินวันเว้น วัน	โรคไข้ทัยฟอยด์	Z23.1
T32	T32	Ty 2 : live attenuated	ทัยฟอยด์เชื้อเป็น2				Z23.1
T33	T33	Ty 3 : live attenuated	ทัยฟอยด์เชื้อเป็น3				Z23.1
T41	T41	Tdap-IPV	ทีดีเอพีไอพีวี	ฉีด	ตั้งแต่อายุ 4 ปี ขึ้นไป	โรคบาดทะยัก-คอตีบ-ไอกรน-โปลิโอ	Z27.3
V11	V11	Var1	วาร1	ฉีด	- 1-12 ปี ให้ 1-2 โด๊ส - 13 ปีขึ้นไป ให้ 2 โด๊ส	โรคอีสุกอีใส	Z25.8
V12	V12	Var2	วาร2	ฉีด	- 1-12 ปี โด๊สสองห่าง จากโด๊สแรกอย่างน้อย 3 เดือน - 13 ปี ขึ้นไป โด๊ส สองห่างจากโด๊สแรก อย่างน้อย 4 สัปดาห์		Z25.8
Y11	Y11	Yellow Fever	ไข้เหลือง	ฉีด	อายุตั้งแต่ 9 เดือน ขึ้น ไป ที่จะเดินทางไปยัง ประเทศที่กำหนดเป็น พื้นที่ติดโรคไข้เหลือง	โรคไข้เหลือง	Z24.3

หมายเหตุ : ชนิดของวัคซีน อายุ และจำนวนครั้งที่ให้บริการขึ้นอยู่กับพิจารณาของแพทย์
ที่มา

- 1.กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน กรมควบคุมโรค
2. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ปรับเมื่อ วันที่ 8 กรกฎาคม 2554