


สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่

สถานการณ์ต่างประเทศ

องค์การอนามัยโลกรายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในภาพรวมทั่วโลก ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2561 โดยภาพรวมในขณะนี้ เขตอบอุ่นของซีกโลกใต้ มีรายงานว่าโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้นในอเมริกาใต้ และเริ่มลดลงในแอฟริกาใต้ โรคไข้หวัดใหญ่อยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์ตามฤดูกาลในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ เขตอบอุ่นของซีกโลกเหนืออยู่ระหว่างฤดูกาลของโรคไข้หวัดใหญ่ มีรายงานการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่ลดลงในบางประเทศในเขตร้อน ทั่วโลกเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลชนิด A เป็นสาเหตุหลักของการตรวจพบส่วนใหญ่ ปัจจุบันมีหลายประเทศที่กำลังเข้าสู่ช่วงฤดูกาลของไข้หวัดใหญ่ องค์การอนามัยโลกจึงแนะนำให้มีมาตรการจัดการที่เหมาะสมเพื่อควบคุมการติดเชื้อ และฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเสี่ยง รายละเอียดสถานการณ์ในแต่ละภูมิภาค ดังต่อไปนี้

- เขตอเมริกาใต้ มีรายงานโรคไข้หวัดใหญ่ในหลายประเทศในภูมิภาคย่อย
 - ประเทศชิลี แม้ว่าจะระดับของโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARI) มีแนวโน้มลดลง แต่อัตราการติดเชื้อโรคทางเดินหายใจ RSV และโรคไข้หวัดใหญ่มักเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่พบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A (H3N2)
 - ประเทศปารากวัย พบรายงานการพบผู้ป่วยกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ILI) สูงกว่าค่ามาตรฐาน และการตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ระดับของ SARI และ RSV ยังคงอยู่ในระดับสูง
 - ประเทศบราซิล อัตราการติดเชื้อโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A(H1N1) pdm09 และเชื้อไวรัสชนิด A (H3N2)
 - ประเทศอาร์เจนตินา การตรวจพบเชื้อโรคไข้หวัดใหญ่อยู่ในระดับต่ำ แต่มีรายงานการเกิด RSV เพิ่มขึ้น
- แอฟริกาใต้ มีรายงานโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ A(H1N1) pdm09 สูงขึ้นในสัปดาห์ที่ 24 และลดลงในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา
- เขตโอเชียเนีย สถานการณ์ไข้หวัดใหญ่อยู่ในระดับต่ำ ทั้งในประเทศออสเตรเลีย และประเทศนิวซีแลนด์ ถึงแม้ว่า ค่า ILI ในออสเตรเลียตะวันตก จะมีแนวโน้มสูงขึ้น และการแจ้งเตือนโรคไข้หวัดใหญ่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยส่วนใหญ่พบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A (H1N1) pdm09


- แอบทะเลแคริบเบียน การตรวจพบโรคไข้หวัดใหญ่ชนิด A และอัตราการติดเชื้อโรคทางเดินหายใจ RSV ลดลง ประเทศในอเมริกากลาง สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่อยู่ในระดับต่ำ ยกเว้นสาธารณรัฐกัวเตมาลา ที่มีการรายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ชนิด A (H1N1) pdm09 อย่างต่อเนื่อง ประเทศแม็กซิโก พบไข้หวัดใหญ่ชนิด A (H1N1) pdm09 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- อเมริกาใต้ สถานการณ์ไข้หวัดใหญ่แตกต่างกันในหลายพื้นที่ ประเทศโบลิเวีย ระดับ SARI และการตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ชนิด A (H1N1) pdm09 และชนิด B ลดลง ในขณะที่ RSV ยังคงอยู่ในระดับสูง มีรายงานพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ ชนิด A (H1N1) pdm09 และตัวชี้วัดอาการโรคทางเดินหายใจลดลง ยกเว้นในประเทศโคลัมเบีย และประเทศเปรู
- ภูมิภาคแอฟริกา
 - แอฟริกาตะวันตก พบรายงานโรคไข้หวัดใหญ่ในประเทศไอวอรีโคสต์ ส่วนใหญ่พบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด B และพบรายงานไข้หวัดใหญ่ในประเทศกานา เป็นเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A (H1N1) pdm09
 - แอฟริกากลาง ในสาธารณรัฐแอฟริกากลาง พบรายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มมากขึ้น ส่วนใหญ่พบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A (H1N1) pdm09
 - แอฟริกาตะวันออก ประเทศเอธิโอเปีย และประเทศมาดากัสการ์ รายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่อยู่ในระดับต่ำ
- เอเชียตะวันออก
 - เอเชียใต้ พบรายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในระดับต่ำ
 - เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบรายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในระดับต่ำ ในประเทศกัมพูชา มีการรายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เป็นไข้หวัดใหญ่ ชนิด A (H1N1) pdm09 และไข้หวัดใหญ่ชนิด B



ที่มา : องค์การอนามัยโลก

http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/


สถานการณ์ประเทศไทย



ที่มา : รายงาน 506 สำนักระบาดวิทยา

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในปี 2561 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 17 สิงหาคม 2561 มีรายงานผู้ป่วยทั่วประเทศจำนวน 84,941 ราย อัตราป่วย 128.58 ต่อประชากรแสนคน มีผู้เสียชีวิต 12 ราย คิดเป็นอัตราราย 0.02 ต่อประชากรแสนคน (จังหวัดนครราชสีมา 8 ราย จังหวัดร้อยเอ็ด 1 ราย จังหวัดหนองคาย 1 ราย จังหวัดสุรินทร์ 1 ราย นครสวรรค์ 1 ราย) จำนวนผู้ป่วยในภาพรวมมีแนวโน้มสูงกว่าค่ามัธยฐาน ค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง แต่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน

❖ จำแนกตามกลุ่มอายุ



ที่มา : รายงาน 506 สำนักระบาดวิทยา

การเกิดโรคไข้หวัดใหญ่จำแนกตามกลุ่มอายุพบว่า ส่วนใหญ่พบผู้ป่วยอยู่ในกลุ่มอายุ 0 - 4 ปี มีอัตราป่วยสูงสุดคือ 535.60 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 5 - 9 ปี มีอัตราป่วย 368.56 ต่อประชากรแสนคน และกลุ่มอายุ 10 - 14 ปี มีอัตราป่วย 180.24 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ จะเห็นได้ว่ากลุ่มผู้ป่วยที่มีอัตราป่วยสูงจะอยู่ในช่วงวัยเด็กและวัยเรียน จึงต้องมีการให้ความสำคัญต่อการป้องกันควบคุมโรคในกลุ่มเด็ก และในสถานที่ที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มากมากขึ้น

❖ จำแนกรายภาค

ภาค	ผู้ป่วย (ราย)	ผู้ป่วยตาย (ราย)	อัตราป่วย (ต่อประชากรแสน คน)	อัตราตาย (ต่อประชากรแสน คน)	อัตราป่วยตาย (ร้อยละ)
กลาง	38639	0	232.50	0.00	0.00
เหนือ	20897	1	168.27	0.01	0.00
ตะวันออกเฉียงเหนือ	18347	11	83.52	0.05	0.06
ใต้	7058	0	75.32	0.00	0.00

ที่มา : รายงาน 506 สำนักระบาดวิทยา


❖ จำแนกตามอัตราป่วยรายจังหวัด 5 อันดับ

อันดับ	จังหวัด	จำนวนผู้ป่วย	อัตราป่วย
1	กรุงเทพมหานคร	20,389	358.68
2	เชียงใหม่	5,767	331.19
3	ระยอง	2,203	312.16
4	พะเยา	1,321	276.28
5	อุบลราชธานี	4,493	240.74

ที่มา : รายงาน 506 สำนักระบาดวิทยา

การกระจายของการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่รายจังหวัด พบว่าจังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร อัตราป่วย 358.68 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ เชียงใหม่ อัตราป่วย 331.19 ต่อประชากรแสนคน ระยอง อัตราป่วย 321.16 ต่อประชากรแสนคน พะเยา และอุบลราชธานี อัตราป่วย 276.28 และ 240.74 ต่อแสนประชากร ตามลำดับ


❖ จำแนกตามเครือข่ายบริการและกรุงเทพมหานคร




ที่มา : รายงาน 506 สำนักระบาดวิทยา

จำแนกตามเขตบริการสุขภาพและกรุงเทพมหานคร พบว่า กรุงเทพมหานครมีอัตราป่วยสูงสุด คือ 358.68 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ เขตบริการสุขภาพที่ 1 และเขตบริการสุขภาพที่ 6 มีอัตราป่วย 217.16 และ 139.07 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ

❖ เหตุการณ์พบผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เป็นกลุ่มก้อน



ที่มา : โปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด



เหตุการณ์พบผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เป็นกลุ่มก้อน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 – 17 สิงหาคม 2561 พบ 39 เหตุการณ์ ใน 28 จังหวัด โดยพบใน เรือนจำ 20 เหตุการณ์ โรงเรียน 9 เหตุการณ์ ค่ายทหาร 3 เหตุการณ์ ที่พัก 5 เหตุการณ์ วัด 1 เหตุการณ์ และโรงพยาบาล 1 เหตุการณ์ ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีการรวมตัวของคนหมู่มาก