



โรคพิษสุนัขบ้า

โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำ เกิดจากเชื้อไวรัสเรบีส์ สัตว์นำโรค ได้แก่ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด เช่น สุนัข แมว ลิง ชะนี โค กระบือ แพะ กระจง กระจง กระแต กระต่าย ค้างคาว ฯลฯ

ระยะฟักตัวของโรคอาจสั้นมากภายใน ๗ วันหลังจากถูกสัตว์ที่มีเชื้อกัดหรือข่วน หรืออาจนานเกิน ๑ ปี อาการในคนเริ่มจากเบื่ออาหาร เจ็บคอ มีไข้ อ่อนเพลีย มีอาการคันรุนแรงบริเวณที่ถูกกัด แล้วอาการคันจะลามไปที่ส่วนอื่นๆ ต่อมาผู้ป่วยจะเริ่มกระสับกระส่าย กลัวแสง กลัวลม ไม่ชอบเสียงดัง เพ้อ กลืนลำบาก ปวดท้องน้อย กล้ามเนื้อขากระตุก แขนหน้าอก หายใจไม่ออก อาจชัก เกร็ง เป็นอัมพาต หมดสติ และเสียชีวิตในที่สุด

การป้องกันไม่ให้สัตว์เป็นโรคพิษสุนัขบ้าและการป้องกันไม่ให้มีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า คือ



ผู้เลี้ยงสุนัขต้องนำสุนัขไปรับการฉีดวัคซีนเมื่อสุนัขอายุ ๒-๔ เดือน ในปีแรกควรฉีด ๒ ครั้ง หลังจากนั้นต้องฉีดกระตุ้นซ้ำทุกปี



ไม่ปล่อยให้สุนัขออกไปนอกบ้านตามลำพัง เมื่อนำสุนัขออกนอกบ้านต้องใส่สายจูง ถ้าสุนัขขุด ควรสวมเครื่องป้องกันสุนัขกัด



ไม่นำสัตว์ป่ามาเลี้ยง



หากพบเห็นสัตว์สงสัยว่าจะเป็นโรคพิษสุนัขบ้า ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที



หากถูกสัตว์กัด ต้องล้างแผลให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ แล้วรีบไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันทีเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมทั้งสัตว์ไว้ดูอาการ ๑๐ วัน



อย่าให้เด็กเล่นกับสัตว์เลี้ยงตามลำพัง ต้องมีผู้ใหญ่ดูแลเสมอ และต้องล้างมือด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้ง หลังสัมผัสกับสัตว์เลี้ยง





การลดความเสี่ยงจากการถูกสุนัขกัดหรือทำร้าย โดยใช้คาถา **๕ ย** คือ

อย่าเหย



อย่าเหย..ให้สัตว์โกรธ

**อย่า
เหยียบ**



อย่าเหยียบ..หาง หัว ตัว ขา ทำให้สัตว์ตกใจ

อย่าแยก



อย่าแยก..สัตว์ที่กำลังกัดกันด้วยมือเปล่า

อย่าหยิบ



อย่าหยิบ..จานข้าวหรือเคลื่อนย้ายอาหาร
ขณะที่สัตว์กำลังกินอาหาร

อย่ายุ่ง



อย่ายุ่ง..หรือเข้าไปใกล้สัตว์ที่ไม่รู้จักหรือไม่มี
เจ้าของ

เมื่อถูกสุนัข-แมวกัดหรือข่วน ต้องล้างแผล ใส่ยา กักหมา-แมว แล้วไปหาหมอ