

สสจ.ตรังเตือนปช.ระวังโรคพิษสุนัขบ้า เน้นพาส์ตรว์เลี้ยงฉีดวัคซีน



นายแพทย์วิฑูรย์ เหลืองดิลก นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ตรัง กล่าวว่า โรคพิษสุนัขบ้า เป็นโรคติดต่อจากสัตว์มาสู่คน ที่มีความรุนแรงมาก ทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าปีละหลายร้อยคน ส่วนใหญ่ถูกสุนัข หรือแมวกัดข่วน แล้วไม่ได้ไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันอย่างรวดเร็ว และครบถ้วน กลุ่มเด็กเป็นกลุ่มที่ถูกสุนัขกัดมากที่สุด และเมื่อเชื้อเข้าสู่ร่างกาย ส่วนใหญ่ใช้เวลาประมาณ ๒-๘ สัปดาห์ ผู้ป่วยจะปวดเมื่อยตามตัว มีไข้ ไข้เจ็บเสียว หรือปวดบริเวณรอยแผลที่ถูกกัด อาการของผู้ป่วยจะแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม

กลุ่มแรก คือ แบบคลุ้มคลั่งอาจมีอาการกระวนกระวาย ระบบประสาทอัตโนมัติผิดปกติ ประสาทหลอน อาจมีชัก หายใจหอบ หมดสติและเสียชีวิตในที่สุด และกลุ่มที่ ๒ คือ แบบอัมพาตเป็นอาการที่พบได้น้อย โดยมีอาการอัมพาต ของแขน ขา พูดไม่ชัด น้ำลายมาก มีอาการกลืนน้ำ กลืนลม หลังแสดงอาการจะอยู่ได้นานกว่าแบบคลุ้มคลั่งและจะเสียชีวิตในที่สุด

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง กล่าวต่อไปว่า โรคพิษสุนัขบ้าสามารถป้องกันได้ โดยเจ้าของสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข แมว ต้องนำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีน ครั้งแรกเมื่อสัตว์เลี้ยง มีอายุ ๒-๔ เดือน แล้วฉีดซ้ำตามกำหนดนัดทุกปี ลดความเสี่ยงถูกสุนัขกัดหรือทำร้ายด้วยคำแนะนำ ๕ ย. คือ ๑.อย่าเหยย ให้สุนัขโมโห โกรธ ๒.อย่าเหยียบ หาง หัว ตัว ขา หรือ ทำให้สุนัขหรือสัตว์ต่างๆตกใจ ๓.อย่าแยก สุนัขที่กำลังกัดกัน ด้วยมือเปล่า ๔.อย่าเหยียบ ขามข้าวหรือเคลื่อนย้ายอาหารขณะที่ สุนัขกำลังกินอาหาร และ ๕.อย่ายุ่ง หรือเข้าไปใกล้กับสุนัขหรือ สัตว์ต่างๆ นอกบ้านที่ไม่มีเจ้าของ หรือไม่ทราบประวัติ และประเด็นสำคัญเมื่อถูกสุนัข หรือแมวกัด ข่วน ต้องทำดังนี้ ๑.ล้างแผลให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่หลายๆ ครั้งให้ถึงกันแผล ล้างสบู่ ออกให้หมด เช็ดแผลให้แห้ง ใส่ยารักษาแผลสด ๒.จดจำ สัตว์ที่กัดเพื่อสืบหาเจ้าของ/กักสัตว์ไว้ดูอาการ ๑๐ วัน สอบถาม ประวัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และสุดท้าย ไปพบ แพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อรับการป้องกันที่ถูกต้อง
