



# ข่าวเพื่อสื่อมวลชน

## สำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข

ก.สาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑

f fanmoph t pr\_moph i clubhealthch v moph channel

โทร. 02 590 1401-2  
โทรสาร. 02 591 8612-3

BUREAU OF INFORMATION, MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

## สธ. เตือนประชาชนรักษาความสะอาดบ้านเรือน ไม่ให้เป็นแหล่งอาศัยของหนู พาหะนำโรคไข้ฉี่หนู

กระทรวงสาธารณสุข กำชับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอสม.ทั่วประเทศเฝ้าระวังโรคไข้ฉี่หนูอย่างใกล้ชิด โรคนี้พบได้ตลอดปี ในทุกภาคของประเทศ ติดต่อกัน ๒ วิธีคือ การรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อฉี่หนู และเข้าทางแผล เยื่อหู หรือผิวหนังที่เปื่อยขึ้น เตือนประชาชนดูแลบ้านเรือนให้สะอาด กำจัดขยะไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของหนู สงสัยป่วยให้รีบพบแพทย์ รักษาหายได้

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า โรคเลปโตสไปโรซิส (Leptospirosis) หรือโรคไข้ฉี่หนู เป็นโรคประจำถิ่น พบได้ตลอดปี แต่จะพบมากในฤดูฝน ช่วงกรกฎาคม-กันยายนทุกปี ซึ่งเป็นฤดูกาลทำการเกษตรกรรม ช่วงหลังน้ำท่วมและน้ำหลาก มีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ ผู้ที่ต้องสัมผัสดินและน้ำเป็นเวลานานๆ เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคไข้ฉี่หนูที่ปนเปื้อนตามแหล่งน้ำ และดินที่ขึ้นแฉะ นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ เช่น ในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขัง หรืออยู่ในที่แออัด มีหนูชุกชุม จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ แม้จะไม่ได้เดินลุยน้ำท่วมขังก็ตาม กำชับให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทั่วประเทศ เฝ้าระวังโรคไข้ฉี่หนูอย่างใกล้ชิด เร่งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้วิธีการป้องกันตัวแก่ประชาชน เพื่อลดการป่วยและการเสียชีวิตที่สำคัญ หากพบผู้ป่วยรายแรกในพื้นที่ ให้รีบดำเนินการสอบสวนโรคในพื้นที่ เพื่อหาปัจจัยเสี่ยง แหล่งแพร่โรค และให้สุขศึกษาเพื่อการป้องกันโรคในผู้ป่วยรายอื่นต่อไป กรณีผู้ป่วยเสียชีวิต ให้ตรวจยืนยันและรายงานการสอบสวนโรคที่สำนักระบาดวิทยาทุกสาย เพื่อวางแผนการป้องกันควบคุมโรคต่อไป

โรคไข้ฉี่หนู เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย อยู่ในฉี่ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เป็นแหล่งรังโรคเช่น หนู วัว ควาย เชื้อโรคนี้อาศัยอยู่ในน้ำได้หลายเดือน สามารถเข้าสู่ร่างกายได้ ๒ วิธี คือจากการรับประทานอาหาร หรือดื่มน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อฉี่หนูเข้าไป และเชื้อเข้าทางแผล เยื่อหูในปาก ตา หรือแผล ผิวหนังที่เปื่อยขึ้น เชื้อก็สามารถไชผ่านไปได้ หลังได้รับเชื้อประมาณ ๗-๑๐ วันจะเริ่มมีอาการ โดยมีไข้สูงทันทีทันใด ปวดศีรษะ ปวดตามกล้ามเนื้อ ปวดบวม หากมีอาการให้รีบพบแพทย์ทันที โรคนี้มียารักษาหายขาด หากไม่รีบรักษาและปล่อยไว้นานจนอาการมากขึ้น อาจเสียชีวิตจากโรคแทรกซ้อนปอดบวม หัวใจล้มเหลว กล้ามเนื้ออักเสบ สมอองและไขสันหลังอักเสบ ไตวาย หากจำเป็นต้องเดินลุยน้ำอย่าโคลนควรสวมรองเท้าบูท และรีบอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาด เช็ดตัวให้แห้ง ดูแลบ้านเรือนให้สะอาดกำจัดขยะไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ ปิดอาหารมิดชิดป้องกันไม่ให้หนูฉี่รดอาหาร ดื่มน้ำสะอาดหรือน้ำต้มสุกอาหาร ส่วนผู้ที่ชำแหละหนูเพื่อนำมาเป็นอาหาร ควรสวมถุงมือและปรุงให้สุกก่อนรับประทาน

ทั้งนี้ ในปี ๒๕๕๘ สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค รายงานผู้ป่วยโรคไข้ฉี่หนูทั่วประเทศ ๒,๑๗๖ คนเสียชีวิต ๓๓ราย ใน ๖๗ จังหวัด พบผู้ป่วยทุกภาค จังหวัดที่มีอัตราป่วยมากที่สุด ๕ อันดับได้แก่ ยะลา ศิริสะเกษ ระนอง กาฬสินธุ์ และเลย อาชีพที่พบสูงสุดได้แก่ เกษตรกร ร้อยละ ๕๕.๘ รองลงมาอาชีพรับจ้าง ๑๗.๓ และนักเรียน ๙.๘ สำหรับในปี ๒๕๕๙ ตั้งแต่ ๑ - ๑๑ มกราคม พบผู้ป่วย ๑๒ คน จาก ๙ จังหวัด

\*\*\*\*\* ๑๗ มกราคม ๒๕๕๙

แหล่งข่าวโดย » สำนักสารนิเทศ

[มกราคม อาทิตย์ ๑๗,พ.ศ ๒๕๕๙ ๐๙:๓๖:๒๘]

